

HAPIrect*Patientdata (initialer)***Rando-nr:**__ __ __**REGISTRERINGS PROTOKOLL
PERIOPERATIVA DATA**

(komplement till ROC-protokoll)

Sjukhus:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __**WHO perf scale:**

- ☐ Normal aktivitet
☐ Symptom - ambulant
☐ Säng < 50 %
☐ Säng > 50 %
☐ Sängliggande

Demens

- ☐ Nej ☐ Lätt ☐ Svår

Avföringsinkontinens:

- ☐ Ingen
☐ Soiling
☐ Inkontinens för lös avföring
☐ Inkontinens för fast avföring

Rökare: ☐ Nej ☐ Ja ☐ Tidigare-slutat ☐ Vet ej

Preop **S-Albumin:**..... **CRP:**..... **Vita:**.....

Hb.....**Tid malign sjd.**

- ☐ Nej ☐ Ja.....

Tid strålbeh bäcken

- ☐ Nej ☐ Ja

Kompl sjd

- ☐ Nej
☐ Hjärta/kärl
☐ Lunga
☐ Lever/njure
☐ Insbeh diabetes
☐ Steroider__ __ __ __ __mg/dygn
☐ Annat; _____

ONKOLOGISK PREOP BEHANDLING

Preop strålbeh: ☐ Nej ☐ Korttids ☐ Korttids med vänt ☐ Långtids

Huvudsaklig orsak till ej anastomos: ☐ insufficient sfinkter
☐ komorbiditet /ålder
☐ annat.....

TYP AV OPERATION: ☐ APE med intersfinkterisk dissektion
☐ Hartmann

Central ligatur a mes inf: ☐ Nej ☐ Ja
 (prox om avg a colica sin)

Rektalca tumörens huvudlokal: ☐ Nedom peritoneala omslagsvecket
☐ Vid omslagsvecket
☐ Ovan omslagsvecket

Tvärstapler vid Hartmann: ☐ 30 mm Antal:___ ___ ___
☐ 45 mm Antal:___ ___ ___
☐ 60 mm Antal:___ ___ ___
☐ annan___ ___ ___

Fabrikat: ☐ Ethicon
☐ Covidien
☐ annat___ ___ ___

Kolon till stomi: ☐ Sigmoidium
☐ Descendens
☐ Transversum

Profylaktiskt stominät: ☐ Nej ☐ Ja

Urinkateter preop: ☐ Nej ☐ Ja
Suprapub kat: ☐ Nej ☐ Ja
KAD ☐ Nej ☐ Ja

Bukdränage: ☐ Nej ☐ Ja

Blodtransf perop:_____ ml

Kompl under op: ☐ Nej
☐ Stor blödning (> 1500 ml)
☐ Kardiell
☐ Pulmonell
☐ Organskada; _____
☐ Faeceskontamination
☐ Annat _____