

HAPIrect

Rando-nr: __ __ __

Patientdata (initialer)

UPPFÖLJNING CA 30 DAGAR POSTOP

(Komplement till ROC-protokollet)

DATUM:.....

Skopi av

anorekt-stumpen:

- ☐ Intakt suturrad
- ☐ Defekt suturrad/recess/fistel
- ☐ Proktit
- ☐ Defekt och proktit

Kirurgiska kompl:

- ☐ Nej
- ☐ Sårinfektion buk
- ☐ Buksårsruptur
- ☐ Nekros / Sårinfektion perineum
- ☐ Suturensuff. med spont. dränage = pussekretion analt
- ☐ Bäckensabscess
- ☐ Blödning/hematom i buken

- ☐ Fistel.....
- ☐ Stomikkompl
- ☐ Mekanisk ileus
- ☐ KAD vid utskrivn

- ☐ Annat

Typ av reop:.....
(på op-sal)

Intervention:

(ej på op-sal)

- ☐ Nej
- ☐ Ja, (datum).....
dag mån år

Typ av intervention:

- ☐ radiologisk perkutan punktion eller dränage
- ☐ transanalt dränage
- ☐ spolning/ revision av perineal sårhåla på avd/mott
- ☐ annan aktiv åtgärd:.....

Vid förekomst, kryssa i. Finns ej med i ROC:

Kardiovask kompl: ☐ Lungemboli

Infektiös kompl:

- ☐ UVI
- ☐ Annat, ej angivet i ROC.....

Övr kompl:

- ☐ Nej
- ☐ Ja;.....